

Villkor för användning av **Vertimec**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Paprika och tomat	Växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp	Sprutning	BBCH 12-89	5 per år	7	3	0,12 mL/m ²	2,16 mg abamectin/m ²	Produkten får bara användas från mars till oktober.	X
Gurka och squash	Växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp	Sprutning	BBCH 10-89	4 per år	7	3	0,12 mL/m ²	2,16 mg abamectin/m ²	Produkten får bara användas från mars till oktober.	X
Melon och pumpa	Växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp	Sprutning	BBCH 10-89	3 per år	7	3	0,12 mL/m ²	2,16 mg abamectin/m ²	Produkten får bara användas från mars till oktober.	X
Sallat och örtekryddor	Växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp	Sprutning	BBCH 12-55	4 per år	7	12	0,05 mL/m ²	0,9 mg abamectin /m ²	Produkten får bara användas från mars till oktober.	X
Jordgubbar	Växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp	Sprutning	BBCH 12-89	3 per år	7	3	0,12 mL/m ²	2,16 mg abamectin/m ²	Produkten får bara användas från mars till oktober.	X

Datum
2022-03-09Diariernr
5.1.1-B21-00661Aktnr
F-2423Produktnamn
VertimecReg nr
4693

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Snittblommor	Växthus	Mot insekts- och kvalster- angrepp	Sprutning		3 per år	7		0,12 mL/m ²	2,16 mg abamectin/m ²		X
Prydnads- växter	Växthus	Mot insekts- och kvalster- angrepp	Sprutning		5 per år	5		0,12 mL/m ²	2,16 mg abamectin/m ²	Gäller inte snittblommor	X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Vid spridning	Ta bort humlekolonier och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen 3 dagar efter behandlingen.	Villkoret är till för skydd av pollinerande insekter i växthus.	X
Personlig skydds- utrustning	Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Vid återinträde i behandlade utrymmen	Utrymmet ska vädras ordentligt före återinträde. Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Hantering av brukslösning	Brukslösningen ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning.	Villkoret krävs för att brukslösningen ska vara homogen under tillredning och spridning.	X
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	