

## Villkor för användning av Carnadine

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Potatis		Mot kolorado- skalbagge ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	Bomspruta	BBCH 40-79	1 per år		7	180 mL/ha	36 g acetamiprid/ha		
Vårkorn, vårvete, vårrågvet och vårhavre		Mot sädestrips ( <i>Limothrips denticornis</i> )	Bomspruta	BBCH 30-69	1 per år			200 mL/ha	40 g acetamiprid/ha		
Höstkorn, höstvet, höstråg, höstrågvet		Mot sädestrips ( <i>Limothrips denticornis</i> )	Bomspruta	BBCH 30-69	1 gång vartannat år			200 mL/ha	40 g acetamiprid/ha		
Sockerbeta, rödbeta och foderbeta		Mot betbladlus ( <i>Aphis fabae</i> ) och betfluga ( <i>Pegomya hyoscyami</i> )	Bomspruta	BBCH 20-49	1 per år			250 mL/ha	50 g acetamiprid/ha	Vid behandling mellan BBCH 20-39 får behandlingen endast ske en gång vartannat år.	
Ärter och böror	Fält	Mot bönsmyg, ( <i>Bruchus rufimanus</i> ) ärtsmyg ( <i>Bruchus pisorum</i> ) och ärtvecklare ( <i>Cydia nigricana</i> )	Bomspruta	BBCH 40-71	1 per år			250 mL/ha	50 g acetamiprid/ha	För att inte överskrida gränsvärdet för resthalter får färska ärter inte skördas före utvecklingsstadium BBCH 79	

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksam ämne		
Morot och nyetablerad kummin	Fält	Mot morotsfluga ( <i>Chamaepsila rosae</i> )	Bomspruta	BBCH 20-39	1 gång vart tredje år			250 mL/ha	50 g acetamiprid/ha	För att inte överskrida gränsvärdet för resthalter i kumminfrö får behandling endast ske under etableringsåret.	

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning bomspruta.	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.	Villkoret är till för att skydda insekter utanför fältet.	
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Vid återinträde i behandlade områden	Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	