

Villkor för användning av Matrigon 72 SG

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Sockerbeta och foderbeta	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 12-19 Maj-juni	1 gång vart tredje år			139 g/ha	100 g klopyralid/ha		X
Rödbeta	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 12-19 Maj-juni	1 gång vart tredje år		42 dagar	139 g/ha	100 g klopyralid/ha		X
Höstraps		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 30-50	1 gång vart tredje år			165 g/ha	119 g klopyralid/ha		X
Vårraps		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 12-50	1 gång vart tredje år			165 g/ha	119 g klopyralid/ha		X
Lin och linfrön		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 20-50	1 gång vart tredje år			165 g/ha	119 g klopyralid/ha		X
Huvudkål och blomkål	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 12-43	1 per år		42 dagar	165 g/ha	119 g klopyralid/ha		X
Kålrot		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 12-15	1 gång vart tredje år			165 g/ha	119 g klopyralid/ha		X
Etablerad vall och gräs för utsäde		Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 21-37 April-juli	1 per år		7 dagar	165 g/ha	119 g klopyralid/ha		X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Hantering av växtmaterial från behandlad gröda	Halm och grovfoder från en behandlad gröda får användas som foder eller strö i det egna jordbruket. Halm och grovfoder från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm eller grovfoder får endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning.	Produkten innehåller kloparylid är persistent och kan finnas kvar i restmaterial och kan skada känsliga grödor.	X
Hantering av växtmaterial från behandlad gröda	Växtmaterial från en behandlad gröda får inte transporteras från det egna jordbruket för kompostering eller biogasproduktion. Växtmaterial från en behandlad gröda får inte användas i växthus, svampproduktion eller som täckmaterial för växter.	Produkten innehåller kloparylid är persistent och kan finnas kvar i restmaterial och kan skada känsliga grödor.	X
Skydd för efterföljande grödor	Produkten innehåller verksamma ämnen som kan skada efterföljande grödor om odling sker tidigare än följande tid efter behandling med produkten: - 30 dagar för omsådd med stråsäd, raps, rybs, gräs, sockerbetor och majs - 12 månader: potatis, tomat, morötter andra flockblommiga växter, baljväxter och sallat.	Produkten innehåller kloparylid som kan skada efterföljande grödor.	X
Skydd för efterföljande grödor	Bladbildande kål, bland annat grönkål, får odlas tidigast 90 dagar efter behandling med produkten.	Produkten innehåller kloparylid som kan leda till överskridande av gränsvärden för resthalter i efterföljande grödor.	X