

## Villkor för användning av Danitron 5 SC

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Äpple och päron		Mot kvalster	Fläktspruta	BBCH 51–85	1 per år		21	2 L/ha	102 g fenpyroximat/ha	Högst 0,75 L produkt per ha och m trädhöjd	
Prydnadsväxter	Växthus	Mot kvalster	Sprutning	BBCH 11–89	1 per år			2 L/ha	102 g fenpyroximat/ha		
Jordgubbar	Växthus	Mot kvalster	Sprutning	BBCH 11–81 samt efter skörd	1 per år		7	2 L/ha	102 g fenpyroximat/ha		
Tomat, aubergin, paprika, slanggurka, zucchini/squash och bönor	Växthus	Mot kvalster	Sprutning	BBCH 11–89	1 per år		7	2 L/ha	102 g fenpyroximat/ha		

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Vid spridning med fläktspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling". Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 99 % användas. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, skyddskläder, skyddsglasögon och andningsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Vid återinträde i behandlade områden	Gå inte in i behandlade områden innan sprutvätskan torkat in. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda de som arbetar i behandlade områden.	
Vid spridning	Ta bort humlekolonier och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen 3 dagar efter behandlingen.	Villkoret är till för skydd av pollinerande insekter i växthus.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.		