

Villkor för användning av Cliophar 600 SL

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstraps och höstrybs	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 30-50	1 gång vart tredje år			0,2 L/ha	120 g klopyralid/ha		X
Vårraps och vårrybs	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 12-50	1 gång vart tredje år			0,2 L/ha	120 g klopyralid/ha		X
Lin och linfrön	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 20-50	1 gång vart tredje år			0,2 L/ha	120 g klopyralid/ha		X
Sockerbetor och foderbetor	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 12-19 Maj-juni	1 gång vart tredje år			0,167 L/ha	100 g klopyralid/ha		X
Rödbetor	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 12-19 Maj-juni	1 gång vart tredje år		42 dagar	0,167 L/ha	100 g klopyralid/ha		X
Huvudkål	Fält	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 12-43 April-juni	1 per år		42 dagar	0,2 L/ha	120 g klopyralid/ha		X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Hantering av växtmaterial från behandlad gröda	Halm och grovfoder från en behandlad gröda får användas som foder eller strö i det egna jordbruket. Halm och grovfoder från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm eller grovfoder får endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning.	Produkten innehåller klopyralid är persistent och kan finnas kvar i restmaterial och kan skada känsliga grödor.	X
Hantering av växtmaterial från behandlad gröda	Växtmaterial från en behandlad gröda får inte transporteras från det egna jordbruket för kompostering eller biogasproduktion. Växtmaterial från en behandlad gröda får inte användas i växthus, svampproduktion eller som täckmaterial för växter.	Produkten innehåller klopyralid är persistent och kan finnas kvar i restmaterial och kan skada känsliga grödor.	X
Skydd för efterföljande grödor	Produkten innehåller verksamma ämnen som kan skada efterföljande grödor om odling sker tidigare än följande tid efter behandling med produkten: - 30 dagar för omsådd med stråsäd, raps, rybs, gräs, sockerbetor och majs - 12 månader: potatis, tomater, morötter andra flockblommiga växter, baljväxter och sallat.	Produkten innehåller klopyralid som kan skada efterföljande grödor.	X
Skydd för efterföljande grödor	Bladbildande kål, bland annat grönkål, och rädisor får odlas tidigast 90 dagar efter behandling med produkten.	Produkten innehåller klopyralid som kan leda till överskridande av gränsvärden för resthalter i efterföljande grödor.	X