

Villkor för användning av Raptol

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behand- ling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Äpple, päron		Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	7	3	15 L/ha	68,9 g pyretriner/ha 12,4 kg rapsolja/ha	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning	
Körbär, plommon		Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	7	3	12,5 L/ha	56,2 g pyretriner/ha 10,1 kg rapsolja/ha	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning	
Vinbär, krusbär och blåbär		Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	7	3	10 L/ha	45,9 g pyretriner/ha 8,3 kg rapsolja/ha	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning	
Sallat, spenat, portlak, persilja, örter, morot, rödbeta, rotpersilja, palster- nacka, rädisa, svartrot, cikoria, kålrot och pepparrot	Fält	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	5	3	6 L/ha	27,5 g pyretriner/ha 5 kg rapsolja/ha	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning	
Sallat, spenat, portlak,	Växthus	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	5	7	0,6 mL/m ²	2,75 mg pyretriner/m ² 495,2 mg rapsolja /m ²	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning	

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behand- ling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
persilja och örter											
Tomat och aubergine		Mot insekts-angrepp	Sprutning		2 per år	5	3	1,2 mL/m ²	5,51 mg pyretriner/m ² 990,4 mg rapsolja/m ²	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning	
Prydnads-växter	Fält	Mot insekts-angrepp	Sprutning	Växter under 50 cm	2 per år	7		6 L/ha	27,5 g pyretriner/ha 5 kg rapsolja/ha	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning	
Prydnads-växter	Fält	Mot insekts-angrepp	Sprutning	Växter över 50 cm	2 per år	7		12 L/ha	55,1 g pyretriner/ha 9,9 kg rapsolja/ha	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning	
Prydnads-växter	Växthus	Mot insekts-angrepp	Sprutning		4 per år	7		1,2 mL/m ²	5,51 mg pyretriner/m ² 990,4 mg rapsolja/m ²	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet. Utrustning som reducerar avdriften ska användas vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken. - Vid spridning i tomat och aubergin samt i prydnadsväxter högre än 50 cm ska utrustning som reducerar avdriften med minst 75 % användas. - Vid spridning i sallad, spenat, portlak, persilja, örter, morot, rödbeta, rotpersilja, palsternacka, rådisa, svartrot, cikoria, kålrot och pepparrot samt i prydnadsväxter lägre än 50 cm ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av fläktspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
	<p>Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion.</p> <p>Utrustning som reducerar avdriften ska användas vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken.</p> <p>- Vid spridning i äpple, päron, körsbär och plommon ska utrustning som reducerar avdriften med minst 99 % användas.</p> <p>- Vid spridning i bär och prydnadsväxter högre än 50 cm ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 % användas.</p>		
Vid spridning	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.	Villkoret är till för att skydda bin och andra pollinerande insekter.	
Tillredning av brukslösning	Produkten ska skakas före användning.	Villkoret är till för att produkten ska vara homogen vid tillredning av brukslösning.	
Utformning av växthus	<p>Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.</p> <p>Omfattar inte tunnelodling.</p>		
Utformning av Tunnelodling	<p>Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.</p> <p>Omfattar inte växthus.</p>		